

ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

Pathostat 64

#2343032, 2343070, 2343087, 2343094,
2343117, 2343124*

Cleaner, Disinfectant, Non-Food Contact Sanitizer,
Deodorizer, Fungicide, Mildewstat, Virucide

FIRST AID

In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.

IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

IF SWALLOWED: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

EPA Reg. No. 10324-93-3640
EPA Est. No. 3640-WI-1



DIRECTIONS



For Use as a General, Hospital Disinfectant, Fungicide, Virucide, Cleaner

1. Pre-clean heavily soiled areas.
2. Apply use solution of 0.5 oz. or 2.25 oz.* of this product per 1 quart of water (or equivalent use dilution) to disinfect hard, non-porous, non-food contact surfaces with a sponge, brush, cloth, mop, by immersion, auto scrubber, mechanical spray device, hand pump, coarse trigger spray device. For spray applications, spray 6-8 inches from surface. Do not breathe spray.
3. Treated surfaces must remain visibly wet for 2 minutes to kill SARS-CoV-2 or for 10 minutes to kill all organisms listed on the label.
4. Allow to air dry.
5. Prepare a fresh solution daily or when visibly dirty.
6. Empty and rinse bottle before refilling.

*This product kills the following viruses in 10 minutes at 2.25 oz. per quart of 400 ppm hard water {(2970 ppm active)} and 5% soil on hard, non-porous surfaces:

Canine Parvovirus {(CPV)} {(Type 2b)}
Rabies Virus {(Clinical Isolate)}

STEARNS

STEARNS PACKAGING CORPORATION

4200 Sycamore Avenue (53714) • P.O. Box 14495, Madison, Wisconsin 53708
Telephone: (800) 655-5008 • (608) 246-5150 • Fax: (608) 246-5149
E-mail: stearns@stearnspkg.com • www.stearnspkg.com

Rev. 0923

ONE PACKS

Dispenser-Free Control Systems®

Pathostat 64

#2343032, 2343070, 2343087, 2343094,
2343117, 2343124*

Limpiador, Desinfectante, Desinfectante de
Contacto Sin Alimentos, Desodorizante,
Fungicida, Mildewstat, Virucida

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia, llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga a mano el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya a un tratamiento.

SI ESTÁ EN LOS OJOS: Mantenga abierto el ojo y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos.

EN CASO DE INGESTIÓN: Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato para recibir asesoramiento sobre el tratamiento.


EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego dele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible.

NOTA PARA EL MÉDICO: El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.

EPA Reg. No. 10324-154-3640
EPA Est. No. 3640-WI-1



INTRUCCIONES



Para uso General, Desinfectante para Hospitales, Fungicida, Virucida, Limpiador

1. Prelimpia las áreas con mucha suciedad.
2. Aplique una solución de uso de 0.5 oz. o 2.25 oz.* de este producto por cuarto de galón de agua (o dilución de uso equivalente) para desinfectar superficies duras y no porosas con una esponja, cepillo, trazo, trapeador automático, dispositivo de pulverización mecánica, dispositivo de pulverización de gatillo grueso. Para aplicaciones de rociado, rocíe 6-8 pulgadas de la superficie. No respire el aerosol.
3. Las superficies tratadas deben permanecer visiblemente húmedas durante 2 minutos para matar el SARS-CoV-2, o 10 minutos para matar todos los organismos enumerados en la etiqueta.
4. Deje que se seque al aire.
5. Prepare una solución fresca diariamente o cuando esté visiblemente sucia.
6. Vacíe y enjuague la botella antes de volver a llenarla.

*Este producto mata los siguientes virus en 10 minutos a 2.25 oz. por cuarto de galón de 400 ppm de agua dura {(2970 ppm activo)} y 5% de suelo en superficies duras y no porosas:

Parvovirus canino {(CPV)} {(Tipo 2b)}
Virus de la rabia {(aislado clínico)}

STEARNS

STEARNS PACKAGING CORPORATION

4200 Sycamore Avenue (53714) • P.O. Box 14495, Madison, Wisconsin 53708
Telephone: (800) 655-5008 • (608) 246-5150 • Fax: (608) 246-5149
E-mail: stearns@stearnspkg.com • www.stearnspkg.com

Rev. 0923